

주

결핵 검사 결과가 양성이면, INH 복용 후에도 보통 여러 해 동안 지속됩니다. 결핵 상태에 대한 증거가 필요할 시에는 아래의 서식을 작성하여 제출하십시오.

투베르쿨린 피부 검사 (PPD)

성명: _____

검사 날짜: _____

결과 확인을 위한 재방문 날짜/시간:

확인 날짜: _____

결과 (mm): _____

양성일 경우, 흉부 엑스레이 검사 날짜/시간:

카운티 보건부



The Florida Department of Health
TB Program

투베르쿨린 피부 검사는

다음 질문에 대한 답을 알려 줍니다:
감염자가 누구입니까?
그것은 무슨 의미입니까?

결핵

결핵이란 무엇인가?

결핵(TB)이란 공기를 통해 전염되는 질환입니다. 오래 전, TB는 “폐결핵(consumption)”이라고도 알려졌습니다. TB균은 사람이 기침하거나, 재채기하거나, 웃거나, 노래할 때 공기 중으로 방출됩니다. TB는 보통 폐에 영향을 주지만 뇌, 신장, 척추 같은 기타 신체 부위에도 영향을 줄 수 있습니다. TB균에 감염된 몇몇 사람들은 결핵이 발생할 것입니다.

결핵 징후

일반적인 징후는 만성적인 기침, 피로, 야간 발한, 해명되지 않은 체중 감소나 발열, 식욕 상실, 또는 기침/가래에 피가 섞여 나오는 것입니다. 흔히 유일한 징후는 지속적인 기침입니다. 이러한 징후는 종종 다른 질병의 징후이기도 하므로, 반드시 진찰을 받아보아야 합니다.

피부 검사

투베르쿨린 피부검사의 목적은 (TB) 결핵을 일으키는 균(세균)의 감염 여부를 알아보는 것입니다.

검사 방법

보통 아래 팔의 피부 표면 층에 무해한 투베르쿨린 단백질을 소량 주입합니다.

검사 결과

검사 실시 후, 검사 부위를 48~72시간 동안 살펴봅니다. 음성이거나 유의하지 않은 경우는 보통 결핵균에 감염되지 않았음을 의미합니다. 그러나 신체의 면역에 영향을 주는 질병이나 특정



약으로 인해 검사 결과가 음성으로 잘못 나올 수 있습니다. 피부 검사를 실시하기 전에 이에 대해 검사 담당자와 논의해야 합니다.

양성이거나 유의한(검사 부위가 붓고, 붉어지고, 물집이 생김) 경우는 결핵에 감염되어 현재 체내에 결핵을 일으킬 수 있는 결핵균이 있음을 의미합니다. 그러나 결핵이 있거나 다른 사람에게 전염시킬 수 있음을 의미하는 것은 아닙니다. 흉부 엑스레이 및 기타 검사를 실시하여 결핵의 존재 여부를 알아보아야 합니다. 때때로 검사 결과가 “의심스러울” 수 있습니다. 검사를 반복할 필요가 있을 것입니다. 검사 담당자는 이것이 필요한 이유를 설명해줄 것입니다.

검사 대상자

현재 결핵에 노출될 위험이 높은 사람은 정기적으로 다시 검사를 받아야 합니다. 활동성 결핵이 있는 사람과 접촉해온 사람들은 가능한 한 빨리 검사를 받아야 합니다. HIV 바이러스에 감염된 사람도 검사를 받아야 합니다.

전염 경로

결핵균은 활동성 결핵이 있는 사람과 같은 공간에서 호흡할 때 폐 속으로 흡입됩니다. 보통 집, 직장, 또는 여가 시간의 대부분을 보내는 곳에서 전염됩니다. 옥외에서 잠깐, 또는 가볍게 접촉해서는 전염되지 않습니다. 흔히 전염원은 파악되지 않으며, 모르는 사이 몇 년 전에 전염되었을 수 있습니다.

대처 방법

일단 전염되면, 언젠가는 결핵이 발생할 수 있습니다. 흉부 엑스레이 검사 결과가 정상이고 아무런 징후가 없다 하더라도, 현재 및 향후 결핵을 예방하기 위하여 약물 치료를 권고받을 수 있습니다. 가장 많이 이용되는 약은 이소니아지드(INH)이며, 의사의 권고에 따라 6~9개월간 매일 복용해야 합니다.

INH 복용 대상

이 약은 결핵이 발생할 위험이 높아 치료를 고려하는 감염자에게 특히 중요합니다. 담당 의사는 당신의 질병 위험도를 설명해 줄 것입니다. 활동성 결핵이 있는 사람과 오래 동안 가깝게 접촉해 온 감염자는 위험이 높다고 간주됩니다. 결핵 발생 위험이 높은 감염자의 예는 HIV 감염자, 흉부 엑스레이 검사에서 “오래된 TB”를 보이는 사람, 또는 (당뇨병 같은) 특정 질병이 있는 사람입니다.



예방이 중요하다

결핵 예방은 여러분과 가까운 분들의 건강뿐만 아니라 여러분 자신의 건강에도 중요합니다.

치료가 권고되지 않거나 치료를 완료하지 않았을 경우에는 결핵의 징후와 증상을 알아두어야 합니다. 질병의 징후나 증상이 나타나면, 즉시 진찰을 받아보아야 합니다.