

VIH/SIDA entre HISPANOS

Estados Unidos*	Florida
En el 2010, el CDC estimó que 872,990 personas estaban viviendo con VIH De ellos, los hispanos representaron:	Hasta el 2013, la Florida ha reportado un total de 102,189 personas viviendo con un diagnóstico de infección por el VIH. De ellos, los hispanos representaron:
19% del total (N=165,159) entre adultos, 20% de los hombres y 16% de las mujeres 17% de los casos pediátricos	21% del total entre adultos, 24% de los hombres y 14% de las mujeres 14% de los casos pediátricos
19% de hombres que tienen sexo con hombres (MSM ¹ por sus siglas en inglés) 21% de los que usaron drogas inyectables (IDU ² por sus siglas en inglés) 17% de los casos de transmisión heterosexual	26% de los hombres que tienen sexo con hombres (MSM por sus siglas en inglés) 18% de los que usaron drogas inyectables (IDU por sus siglas en inglés) 14% de los casos de transmisión heterosexual
15% de las muertes ocurridas por SIDA en el 2010	12% de los casos de muertes ocurridas por SIDA en el 2013
Según el Departamento del Censo de los Estados Unidos del 2010, 16% de la población en Estados Unidos era hispana.	De acuerdo a estimados de población en la Florida en el 2013, el 24% de la población era hispana

En el 2011, la tasa estimada de hispanos diagnosticados con VIH en los EE.UU. fue de 19.5 por cada 100,000 habitantes, la cual fue más baja que la de Florida (38.7) para el mismo año.

En el 2011, la tasa estimada de SIDA entre hispanos en los EE.UU. fue del 12.2 por cada 100,000 habitantes, y la de Florida fue del 18.4 por cada 100,000 habitantes.

Prevalencia de algunos factores de riesgo del VIH entre la población hispana de EE.UU y Florida

Factores de Riesgo	Hombres		Mujeres	
	EE.UU. hasta el 2010	Florida hasta el 2013	EE.UU. hasta el 2010	Florida hasta el 2013
MSM ¹	66%	75%	-----	-----
IDU ²	17%	7%	25%	12%
MSM/IDU	6%	4%	-----	-----
Heterosexual	10%	13%	71%	85%
Otro/Riesgo no identificado	1%	1%	3%	3%

De acuerdo tanto a la información nacional, como de la Florida, el tiempo de sobrevivencia de los enfermos de SIDA hasta que fallecen por esa enfermedad, es significativamente diferente para los hispanos que para los otros grupos étnicos. De los casos de SIDA que han muerto en la Florida desde el 2007 hasta el 2013 por esa causa, los hispanos sobrevivieron un promedio de 60 meses, comparado con 83 meses que sobreviven lo de la raza blanca.

Pasos para reducir el VIH/SIDA entre la población hispana:

- Incrementar entre los hispanos el conocimiento sobre el VIH/SIDA;
- Alentar a las personas hispanas a hacerse la prueba del VIH;
- Si usted está infectado con el VIH/SIDA, comience tratamiento y cuidado.
- Involucrar a los jóvenes en los programas de planificación, decisiones y prevención del VIH;
- Disminuir las barreras para hacerse la prueba, prevención y cuidado del VIH, eliminando el estigma existente en la comunidad sobre el VIH/SIDA;
- Diseminar información sobre los beneficios para la salud en el uso del condón y otras medidas de prevención.
- Data de la Florida: FL Department of Health, Bureau of Communicable Disease, HIV/AIDS Section
- Para mayor data visite: <http://floridaaids.org/>, cliquee trends and statistics, y vaya a la presentación de las tendencias hispanas.
- U.S. data: HIV Surveillance Report, 2011 (lo más reciente disponible) Vol. 23 (VIH data para los 50 estados) <http://www.cdc.gov/hiv/topics/surveillance/resources/reports/index.htm>
- Para los hechos a nivel nacional visite: <http://www.cdc.gov/hiv/resources/factsheets/index.htm> o <http://www.kff.org/hiv/aids/>

En el 2012, la proporción de nuevos casos de VIH reportados entre hispanos aumentó de un 20% en el 2004, a un 26% en el 2013.

La tasa de nuevos casos de VIH en la Florida durante el 2013 entre hispanos adultos, fue 2.2 veces más alta que la de los hombres blancos, y 2.6 veces más alta entre las mujeres hispanas adultas, que entre las mujeres blancas.

Entre hispanos adultos (edad 13+) uno de cada 106 hombres y una de cada 462 mujeres están infectados con VIH, comparado con uno de cada 187 hombres blancos y una de cada 1,080 mujeres blancas.

De los 18,752 hispanos viviendo con un diagnóstico de VIH hasta el 2013, 35% nacieron en los EE.UU., 18% en Cuba, 11% en Puerto Rico, 6% en México, 19% en otros países y 11% desconocen el país de origen.

En 2013 en la Florida, el VIH fue la séptima causa de muerte entre hombres hispanos comprendidos entre las edades de 25-44, y la octava causa de muerte entre mujeres hispanas de 25-44.

