

INH 복용 방법:

1. 매일 같은 시간에 INH를 복용하십시오. 달력을 이용하여 약을 복용할 때마다 복용 날짜에 X표를 하십시오. 단 하루도 거르지 않는 것이 매우 중요합니다.
2. 이 약을 복용하는 동안에는 술을 마시지 마십시오.
3. 아이들의 손이 닿지 않는 안전한 곳에 INH를 보관하십시오.
4. 모든 예약을 지켜야 함을 유념하십시오.
5. 부작용 발생 시에는 귀하의 치료를 관리하는 카운티 보건부의 담당 간호사나 담당 의사에게 연락하십시오.

6. 특별 지시사항:



다음 예약 일시:

날짜:	시간:

문의처:

Florida Department of Health
TB Program

DH 150-829, 10/04



INH

결핵을 치료해
 드립니다.

Korean Version



난 아프지 않아요! 왜 약을 복용해야 하는가?

검사 결과 당신은 몸 속에 결핵(TB)균이 있는 것으로 나타났거나, 최근 활동성 전염성 결핵에 노출된 적이 있습니다. 아직은 활동성 결핵이 발생되지 않았습니니다. 현재 당신의 TB균은 “휴면” 상태지만, 살아 있습니다. 그 균들은 폐, 척추, 신장 같은 신체의 여러 부위로 이동하였습니다. 당신은 “잠복성 TB 감염”이라고 하는 상태입니다. **잠복성 TB 감염 상태일 경우에는 다른 사람에게 TB를 옮기지 않습니다.**

그러나 다른 병을 앓게 되거나 “몸 상태가 좋지 않을” 경우에는 TB균이 휴면 상태에서 깨어나 더 많은 TB균이 자라기 시작하여 활동성 결핵으로 진전됩니다. **활동성 결핵이 생기면, 다른 사람, 특히 당신과 가장 가까운 사람들에게 옮길 수 있습니다.**

체내의 TB균 제거 방법

TB균을 없앨 수 있는 TB약으로서, INH라고도 부르는 이소니아지드(isoniazid)를 복용해 보십시오. 의사의 처방대로 이 약을 복용하면, 활동성 결핵이 발생할 확률이 크게 감소할 것입니다.

INH 복용 기간

INH는 보통 일일 1회, 또는 의사의 처방에 따라 복용합니다. 치료 기간은 6~9개월로 차이가 있습니다.

INH는 정기적으로 복용할 경우에만 효과가 있습니다 — 매일, 또는 의사의 처방에 따라.

치료 기간 동안 직접 관찰 요법(DOT)을 받을 수 있습니다. DOT란 INH를 복용할 시간이 되었을 때마다 건강 관리사가 와서 복용하는 것을 관찰하는 것을 말합니다.

INH는 안전한가?

연구에 따르면, INH는 모든 연령의 사람들에게 매우 안전하고 효험 있는 약입니다. 대부분의 사람들은 이 약을 복용하는 데 문제가 없습니다. 다른 약과 마찬가지로 부작용이 발생할 수 있습니다. 부작용은 보통 지속적인 영향이 없으며, 치료를 중단하면 없어집니다. **아래에 명기된 문제들 중 어느 하나라도 발생할 경우에는 INH 복용을 중단하고 즉시 담당 의사나 카운티 보건부 간호사에게 연락하시기 바랍니다.**

INH의 부작용:

1. 식욕 상실 및 이유 없는 피로감
2. 소변 색이 어두움 (차나 커피 색)
3. 눈의 색깔이 노랗거나 “둔탁함”
4. 누르스름한 피부색, 발진, 또는 피부가 계속해서 가려움
5. (“핀이나 바늘로 찌르는 것처럼”) 계속해서 따끔거리거나, 손발 저림
6. 해명되지 않은 고열

TB로부터 당신을
보호하도록 도와드립니다!

